

Variedad	Santa Caterina
Capacidad de enraizamiento %	2. (muy bajo)
Calidad de la floración (% aborto ovárico)	47
Polinización libre % PI3	0.12
Autopolinización % PI3	0.021
Época de envero	3ª decada de octubre
Fuerza de retención del fruto FRF	5. (muy alta)
Peso medio fresco del fruto (pf Fr)	4. (alto)
Peso medio fresco del endocarpio, (pfH)	5. (muy alto)
Relación pulpa-hueso de la aceituna (pf Fr/pf H)	2. (media)
Porcentaje de aceite de la aceituna (% Act Fr/m.s.)	3. (medio)
Porcentaje de aceite de la pulpa (% ActP/m.s.)	1. (muy bajo)
Inicio de floración	26 de mayo
Inicio de plena floración	30 de mayo
Final de plena floración	4 de junio
Endurecimiento del endocarpio	1ª decada de agosto
Color aceitunas al 27 de septiembre	1
Color aceitunas al 12 de octubre	1
Color aceitunas al 19 de octubre	1
Color aceitunas al 25 de octubre	1-2
Color aceitunas al 05 de noviembre	1-2
Color aceitunas al 18 de noviembre	1-2-3
Color aceitunas al 14 de enero	2-3
Color aceitunas al 03 de enero	3-4
Caída natural (%) 03 de diciembre	11.2